## NOTICIA

DO USO

QUE DEVE FAZER-SE

# DE SWAIM,

ACCOMPANHADA DE CERTIFICADOS

DE

#### **VARIOS DOS MELHORES MEDICOS**

Traduzida por

MANOEL CLAUDIO D'ALMEIDA.

L'intérêt général du public est le seul object de mon travail.

MIRABEAU.

RIO DE JANEIRO

NA TYPOGRAPHIA DE CUNHA & VIEIRA.



1830.

319395

ACCRECATE A

A. H. T. T. T. T.

WHO DESCRIPTION OF THE PARTY OF

THE PROMISE

LIBRARY

AMERICAN down

•

-( ) | (0) | (0) | (0) |

#### ADVERTENCIA AO PUBLICO.

As innumeraveis falsificações praticadas respectivamente ao meu remedio, me necessitaõ a mudar novamente a figura das garrafas que o contem, as quaes d'hoje em diante seraō redondas, goivadas ao comprido, e com esta inscripção gravada no vidro; "Swaim's Panacea Philada...

Ellas seraō mais fortes, do que as de que nos temos servido thé hoje, e offereceráō o meu nome n'um letreiro pregado na rolha, o qual sendo legivel, certificar-vos-ha de que o remedio é verdadeiro genuino e alias que elle está falsificado; e que consequentemente é supposto, fazendo-vos notar que a sua falsificação é

punivel em Direito.

O auge da exigencia deste transcedente remedio me animou a minorar o seu preço a fim de facilitar aos pobres o seu uzo. Elle não demanda elogios, os seus maravilhosos effeitos lhe adquirirão assim dos doentes, como dos medicos practicos, os mais abalisados a sua approvação, a qual lhe tem merecido um conceito tal, que a malignidade dos invejosos jámais poderá extinguir. Esses falsos rumores

espalhados por alguns medicos a respeito delle devem considerar-se como effeitos ou da inveja, ou dos máos exitos das suas fraudulentas imitações.

Assevero-vos solemnemente que na composição deste remedio não entra ingrediente algum

mercurial, eu mortifero..

W. M. Swaim.

Instrucções sobre o como se deve usar da Panacea de Swaim, remedio efficacissimo para eurar as molestias Scrofulosas, Venereas, Merquriaes, Reumaticas, Ulcerosas, Hepaticas, e Cutaneas, e igualmente a debilidade geral do Systema, os humores frios, e em geral todas as molestias, occasionadas pela impureza do sangue.

A dose de Panacea, que deve tomar um adulto ou homem é um copo de vinho pela manhan antes de comer, e outro á noite antes de se deitar, ou melhor, dividirá os dois copos em trez porções, das quaes tomará uma pela manhan, outra ao meio dia, e outra á tarde. Se ella lhe occasionar alguma sensação desagradavel provavelmente do estomago vasio, poderá toma-la meia hora pouco mais ou menos depois do almoço. Se o doente porám estiver fraço, ou ella excessivamente o purgar ou lhe causar grande desprazer, deve diminuir a dose até que ella se adapte ao estado do seu estomago.

Deve observar-se que quando o doente experimentar summa debilidade deve tomar a primeira garrafa em nequenas doses, isto é, de sopa pela manhan e outra á tarde, e fazendo uso da segunda, pode augmentar ou diminuir a dose segundo a occasiao o permittir. Esta observação deve servir de regra geral aos meninos pela qual meção e proporcionem as suas doses. Advertindo, que é necessario conservar o ventre lubrico, e não operar mais d'uma ou duas vezes por dia; pois a purgação não é necessaria, excepto constipando o doente, o qual então tomará um leve purgante ou d'oito em oito, ou de quinze em quinze dias, conforme o demandarem as circunstancias.

E se o doente quizer tomar qualquer outroremedio simultaneamente com a Panacéa, sem receio o pode fazer, ficando certo, de que aquelle nao poderá obviar a efficacia d'esta.

A dose de panacéa que devem tomar as mulheres é com pouca differerença dois terços da que tomao os homens, observando, nao obstanteisto, as instrucções supra-escriptas.

As que devem tomar os meninos d'um té cinco annos é uma colher de chá duas vezes por dia, de cinco té dez uma de sobremeza, de dez té doze uma de sopa servindo-se de colheres maiores ou menores segundo à idade do menino. Depois de ter tomado este remedio o espaço d'uma semana devem diminuirlhe a doze té ao meado da subsequente, e depois continuar a tomal-o da mesma maneira, que na peaultima, diminuindo-a na seguinte, e procedendo da mesma maneira durante o tempo em que o tomar. Se o doente tiver ulceras deve limpa-las e cura-las por

meio d'um brando enguento, ou uma cataplasma, feita de paō, leite, e um pouco d'unto sem sal como o exigir a occasiaō ou

um Medico approvado o preceitar.

Se as ulceras affectarem as amygdalas, o paladar ou qualquer outra parte da garganta deve gargareja-las com um bom gargarejo, como 4 graos de sublimado doce dissolvido em meia canada d'agoa de cal, ou melhor com um gargarejo de salva, de borax refinado, de mel etc.

Deve guardar-se um regimen moderado; o doente pode comer carnetodos os dias; mas carne leve e de facil digestaō, com caldo, cevada, arroz, sagú, sopa etc. As pessoas debilitadas podem tomar todos os alimentos tendentes a fortificalas, e restabelece-las, como carneiro, vaca assada, arrôs óvos aves etc. podem beber cerveja, abstendo-se porem do uso d'ácidos do Reino vegetal, como vinagre, limaō, cidra etc. e podem comer sem escrupulo fructas perfeitamente maduras. Se o doente estiver summamente debilitado naō deve expor-se ao frio e humidade.

Se as pessoas atacadas de Siphylis, Rheumatismo, obstrucçō de figado tendo tomado 2 ou 3 garrafas de panacéa naō experimentarem vantajosos effeitos devem tomar 4 graōs da pillula denominada—blue pill—ou pillule de Plommer, todas as noutes conjuntamente com a panacéa até que as gengivas sejaō legerramente affectadas cessando des de entaō de as

tomar.

Deve guardar-se a panacéa n' um lugar fres-

co, e antes de a tomar, deve virar-se para baixo duas ou tres vezes o gargallo da garrafa em vez de a sacudir. O doente pode tomar este remedio ou simplesmente, ou misturado com agoa, ou algua outra bebida agradavel: quando elle der indicios de que está proximo a frementar-se devem immediatamente, po-lo ao fogo dois, ou tres minutos, e esfriado que seja, devem lança-lo na garrafa para que o doente continue a servir-se delle.

N B. A Panacéa tem sido efficaz em outras muítas molestias, que aqui nao relaciono.

Faz-se tao-bem uso della na primavera, e no fim do outono para purificar o sangue pela causal de ser este o tempo em que a naturesa exige nutriçao e vigor. Entre os adultos quando a molestia é obstinada sao necessarias 3 a 6 garrafas de panacea para efectuar-se o seu curativo, e depois d'haverem cessado de a tomar o espaço d'uma semana, tendo-se extinguido ja os symtomas da molestia devem tomar mais 2 ou 3 garrafas, com espicialidade nos casos de molestias inveteradas.

W. M. Swaim.

Certificado do Doutor John Y. Clarke, Membro da Se ciedade de Medicos de Philadelphia, &c.

Tendo-se-me offerecido frequentes occasiões d'experimentar os effeitos da Panacea de Swaim, cumpre-me cordial, e francamente confessar, que elles me tem occasionado summa satisfação, com especialdade nos curativos de molestias Scrofulosas, Syphiliticas, e nos de Tumores, e Ulceras, ja consideravelmente adiantadas.

#### Do Doutor DEL VALLE.

Eu Fernando Gonzalez Del Valle (D. de M.) Professor publico de Medecina, e Cirurgia, na real e apostolica Universidade de S. Jeronimo d' Havana, membro da Sociedade real, e patriotica dos amigos da Patria &c. Certifico pela presente que do uso, e applicaçao, que tenho feito do remedio, denominado "Panacea de Swaim" me tem resultado inexplicaveis vantagens, tendo já curado dois sugeitos, cujas molestias nao cediao aos mais excellentes remedios, que a arte de curar nos suggere. Um delles soffria Herpes chronico, e o outro ulceras venereas, complicadas d'uma gonorrhéa, ha longo tempo existente, tendo tomado a quelle 5 garrafas do supradito remedio, e este 6. Os casos, em que ora uzo delle sao os d'ulceras carcinomatoas, ou cancresas; ainda que os doentes nao estejao perfeitamente curados, todavia gosa de grande alivio supurando aquellas mais facilmente. He o que actualmente posso expender á cerca de tao inestimavel remedio.

#### Fernando Gonzalez Del Valle

O Doutor Alexandre Knight., Official da Saude do Porto de Philadelphia, Membro da

Sociedade de Medicos; &c.

Como tenho experimentado a decisiva efficacia do remedio intitulado "Panacéa de Swaim (em muitos casos de molestias inveteradas, que haviaō resistido ao tratamento ordinario) demanda a Justiça que sem hesitação presente o meu testemunho em seu abono. D'entre os inumeraveis casos que me saō notorios, os de Madame Hocher, em Kensington, e do filho de J. Lambert, saō os que mais

devem attrahir a nossa attenção.

No primeiro caso dava-se uma extensa ulce ração, coexistindo ja com ella caries nos ossos da figura, que rapida e velozmente se dirigia ao nariz e ao paladar; no segundo, uma ulceração gangrenosa, aqual descobrindo-se no interior das faces, se extendia ao exterior d'ellas, e havia destruido parte d'uma, dando indicios de as destruir totalmente. Nestes dois casos as molestias se extendiao, se augmentavao cada vez mais, não obstante o mui activo tratamento, que infructuosamente se effectuava; porem o uso da Panacéa de Swaim promptamente prevenio o seu progresso, e o curativo progredio.

Alexandre Knight.

### ERRATAS

Pag.	li.	erros	emendas
Pag.	1,1	é verdadeiro ge- nuino e aliàs	é verdadeiro e ge- nuino; aliás.
4	20	provavelmente	proveniente.
5	21	as que	a que.
6	1	uma cataplasma	um cataplasma.
Ib.	2	feita	feíto.
8.	27	cancresas	cancrosas.